

**11. TABLA DE TIEMPO DE VUELO MINMO Y RECOMENDACIONES PARA PASAJEROS CON CONDICIONES GINECOOBSTETRICAS.**

<b>CONDICION MEDICA</b>	<b>Días para volar</b>	<b>Riesgos</b>	<b>Recomendaciones</b>
EMBARAZOS NO COMPLICADOS MAYORES A 36 SEMANAS	No aptas para vuelos internacionales	PARTO EN VUELO. Sangrado uterino, trauma abdominal cerrado y al producto de la gestación en caso de aterrizajes forzoso o turbulencias	
	Apta para vuelo nacional con certificación médica	Sangrado uterino, trauma abdominal cerrado y al producto de la gestación en caso de aterrizajes forzoso o turbulencias	No deben ser ubicadas en salidas de emergencias, uso de cinturón de seguridad con cuidado de no generar compresión abdominal uterina
EMBARAZOS NO COMPLICADOS ENTRE 32 SEMANAS Y 36 SEMANAS	Aptas para vuelos internacionales aptas para vuelos nacionales con certificación médica de especialista tratante	Sangrado uterino, trauma abdominal cerrado y al producto de la gestación en caso de aterrizajes forzoso o turbulencias durante el vuelo	En caso de vuelos de duración mayor a 8 horas se recomienda el uso de profilaxis con medidas anti embolicas tipo medias de compresión venosa y movilización de extremidades durante el vuelo  Deben tener autorización médica para vuelo por medico
EMBARAZOS COMPLICADOS ENTRE 32 SEMANAS Y MAYOR TIEMPO GESTACIONAL	NO APTOS PARA VUELO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA		
EMBARAZOS DE ALTO RIESGO MENORES A 28 SEMANAS	Aptas para vuelos nacionales e internacionales, se deben direccionar a sanidad aeroportuaria con soportes de seguimiento al embarazo si presentan reporte de Alto riesgo	Sangrado uterino, trauma abdominal cerrado y al producto de la gestación en caso de aterrizajes forzoso o turbulencias	En caso de vuelos de duración mayor a 8 horas se recomienda el uso de profilaxis con medidas anti embolicas tipo medias de compresión venosa y movilización de extremidades durante el vuelo
SANGRADOS UTERINOS ANORMALES DE CUALQUIER ETIOLOGIA	NO APTAS PARA VUELO BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA	Inestabilidad hemodinámica, Shock Hipovolémico, Muerte	Contraindicación absoluta
<b>CONTRAINDICACIONES RELATIVAS PARA VUELO</b>			
ABORTO RETENIDO	Apto para vuelos no mayores a 6 horas con autorización de médico tratante si la paciente se encuentra hemodinámicamente estable	Inestabilidad hemodinámica, Shock Hipovolémico, Muerte	Contraindicación Relativa. Dependerá de las condiciones en que se encuentre la paciente a su llegada a sanidad aeroportuaria
DISTOCIAS FETALES RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO FETAL HISTORIAL DE EMBARAZO ECTÓPICO O ABORTO INVOLUNTARIO EDAD MATERNA $\leq 15$ O $\geq 35$ AÑOS GESTACIÓN MÚLTIPLE PLACENTA PREVIA U OTRA ANORMALIDAD PLACENTARIA	Apto para vuelos no mayores a 6 horas con autorización de médico tratante si la paciente se encuentra hemodinámicamente estable	Inestabilidad hemodinámica, Shock Hipovolémico, Muerte	Contraindicación Relativa. Dependerá de las condiciones en que se encuentre la paciente a su llegada a sanidad aeroportuaria